



MarVis medical srl

VIALE TRIESTE 82 - GRADISCA D'ISONZO (GO)
P.IVA 01225820313 - TEL. +39 0481 99870

PULIZIA E MANUTENZIONE PROTESI MOBILI

Lavi le protesi sotto acqua corrente con l'apposito spazzolino ed una piccolissima quantità di detersivo per piatti in gel in modo da asportare i residui di cibo e non graffiare la resina delle protesi.

Puo' utilizzare anche l'apposito gel GELDIS che trova in farmacia.

Non utilizzi il normale dentifricio

perchè può graffiare e rendere porosa la resina della protesi.

Tale operazione va eseguita quotidianamente dopo i tre pasti principali. Alla sera prima di andare a dormire, togliere le protesi e lasciarle a bagno nell'apposito recipiente con la pastiglia effervescente per la detersione notturna.

Se dovesse avere bisogno di applicare la crema adesiva per assicurare la stabilità delle protesi, ne applichi una piccola quantità sulle protesi dal lato di appoggio alle mucose ed indossi immediatamente le protesi. I primi giorni possono formarsi delle piccole afte a causa di frizioni delle protesi in qualche punto,

è assolutamente normale e nell'immediato è meglio non portare le protesi fino a completa guarigione, verranno previsti degli appuntamenti di controllo per regolare l'appoggio mucoso e ridurre al minimo tale disagio. La protesi inferiore sarà resa molto instabile dall'attività della lingua, se l'arcata è rimasta a lungo edentula, si può essere instaurata un'iperfunzione linguale. La lingua può essere di dimensioni maggiori proprio perchè è andata ad occupare con il suo volume anche la zona dove dovevano esserci i denti: introducendo la nuova protesi,

sicuramente la lingua si troverà costretta in uno spazio minore e con la sua forza, durante i normali movimenti, tenderà a muovere la protesi inferiore.

La mobilità della protesi inferiore sarà più evidente nel primo periodo, poi con l'abitudine viene "accettata".

In caso di persistenza della mobilità della protesi inferiore è possibile stabilizzarla con due impianti osteointegrati.